

Beiträge zur Kenntnis der österreichischen Molluskenfauna XXXV.
Cepaea nemoralis (LINNE 1758) aus Obergänserndorf (NÖ).-

Von WOLFGANG FISCHER, Wien.

Summary

Cepaea nemoralis (LINNE 1758) has been found in the Weinviertel (Lower Austria) for the first time.

Cepaea nemoralis (LINNE 1758) wurde in Obergänserndorf erstmals im Weinviertel (NÖ) nachgewiesen. Der Ort liegt westlich der Bundesstrasse 6 in Richtung Ernstbrunn. Nach einer Rodung der Gehölze zwischen zwei Weinkellern (Abb. 1) wurde eine größere Anzahl von Gehäusen der Gattung *Cepaea* gefunden. Die Mehrzahl wurden der Art *C. hortensis* (O. F. MÜLLER 1774) zugeordnet. Von *Cepaea nemoralis* wurde einige frische Gehäuse gefunden.



Abb. 1: Fundort von *Cepaea nemoralis*

Diese Art wurde hier sicherlich eingeschleppt - vermutlich mit Weinreben oder Materialien, die im Weinbau benötigt werden.

Das Vorkommen in Wien-Simmering (FISCHER & SCHULLER 2012) dürfte auf Grund von Bauarbeiten mittlerweile wieder erloschen sein.

FISCHER W. & N. SCHULLER (2012): Beiträge zur Kenntnis der österreichischen Molluskenfauna XXVI. Ein neuer Fund von lebenden *Cepaea nemoralis* (LINNE 1758) in Wien.- Nachr.bl. erste Vorarlb. malak. Ges. 19:13-14, Rankweil.

Adresse des Autors

Wolfgang Fischer, Martnigasse 26, 1220 Wien, Österreich.

email: Wolfgang.Fischer@boku.ac.at